



Pneumonia por staphylococcus aureus adquirido na comunidade

PIO, M. E. A.; MAGESTE. P. S.; FERREIRA, A. P; FONSECA, W. L.

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ.
priscila_mageste@hotmail.com

RESUMO

Pneumonia adquirida na comunidade do ponto de vista prático é aquela que se manifesta clinicamente na comunidade ou dentro das primeiras 48 horas da internação. Esse estudo se constitui numa revisão sistemática da literatura científica, incluindo artigos que foram publicados de 2007 a 2012. Vem ocorrendo um aumento do número de infecções por estafilococos na comunidade, especialmente pelo MRSA. A sintomatologia da pneumonia por estafilococos é geralmente de instalação aguda. Os sintomas mais comuns são dispnéia, febre alta com calafrios, tosse, dor torácica pleurítica, expectoração purulenta ou mucopurulenta. Os métodos de identificação etiológica têm rendimento imediato baixo e são desnecessários em pacientes ambulatoriais. Nos casos de PAC grave com falência do tratamento empírico, a identificação etiológica e o tratamento direcionado associam-se a menor mortalidade. O esquema inicial geralmente é empírico. A escolha da terapia depende do uso de antibióticos nos últimos meses, da presença de comorbidades, da gravidade da pneumonia e outros. Dessa forma, alguns protocolos relatam medidas de prevenção para evitar a disseminação da cepa, dentre elas: a redução do uso de antibióticos.

Palavras-chave: pneumonia adquirida na Comunidade por staphylococcus aureus e pneumonia por staphylococcus aureus resistente a metilina.